

すいか	つる枯病、菌核病、炭疽病			収穫前日まで	5回以内		6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
メロン							
ブロッコリー	菌核病	2000~4000倍			3回以内		4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)
カリフラワー		2000倍					
はくさい	白斑病、菌核病	2000~3000倍		収穫7日前まで	2回以内		3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
	炭疽病						
キャベツ	菌核病、根朽病				6回以内		7回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内)
アスパラガス	茎枯病、株腐病	2000倍		収穫前日まで	4回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)
ほうれんそう	萎凋病		3L/m ²	収穫21日前まで	2回以内	灌注	3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
パセリ	立枯病	1000倍		収穫45日前まで	2回以内		
みずな				収穫14日前まで			
チンゲンサイ	炭疽病、白斑病	4000倍	100~300ml/m ²	収穫7日前まで	1回	散布	2回以内(種子粉衣は1回以内、散布は1回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)				収穫21日前まで			
いちご	炭疽病	500倍	—	仮植前		10~30分間苗根部浸漬	9回以内(種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、育苗期の灌注は3回以内、本圃定植後の灌注は1回以内、散布は3回以内)
			100mL/株	本圃定植後但し収穫30日前まで	1回	灌注	
			50~100mL/株	育苗期	3回以内		
	—		仮植前	1回	1~3時間苗根部浸漬		