

	ガ、アメハンミョウ、アブラムシ類、アミンクイガ					
とうもろこし	アワノメイガ、カメムシ類					
かんしょ	イモコガ、アブラムシ類、ヨツモンカメノコハムシ			収穫7日前まで	5回以内	
ごぼう	アブラムシ類、フキノメイガ			収穫14日前まで	2回以内	
らっきょう	アザミウマ類		100～300ml/m <sup>2</sup>	収穫7日前まで	本剤:2回以内 MEP:3回以内 (植付前は1回以内、植付後は2回以内)	
	ネダニ類		—	植付前	本剤:1回以内 MEP:3回以内 (植付前は1回以内、植付後は2回以内)	30分間種球浸漬
かき	カキハタムシガ、カキホソガ、アメリカシロヒトリ、フジコナカイガラムシ、オオワタコナカイガラムシ、カメムシ類、イラガ類、ミノガ類若齢幼虫			収穫30日前まで	本剤:3回以内 MEP:3回以内 (樹幹処理は2回以内)	
うめ	アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類				2回以内	
おうとう	アブラムシ類	1,000～2,000		収穫14日前まで	本剤:2回以内 MEP:2回以内 (樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)	散布
大粒種ぶどう	アブラムシ類、ブドウスカンバ、ブドウトリハ	1,000～2,000	200～700ml/m <sup>2</sup>	収穫21日前まで	本剤:2回以内 MEP:4回以内 (収穫終了後から)	
	ハマキムシ類、ブドウトラカミキリ、キンケクチブトゾウムシ成虫	1,000				
小粒種ぶどう	アブラムシ類、ブドウスカンバ、ブドウトリハ	1,000～2,000		収穫90日前まで	萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)	
	ハマキムシ類、ブドウトラカミキリ、キンケクチブトゾウムシ成虫	1,000				
みかん	アブラムシ類	1,000～2,000			収穫14日前まで	本剤:5回以内 MEP:5回以内