

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びマラソンを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数 ※	
花き類・観葉植物	アブラムシ類、ハダニ類 アザミウマ類	2,000 倍	100 ~ 300 mℓ/m ²	発生初期	散布	6 回以内	
きく	ヨトウムシ類						
サルビア	オンブバッタ						
マリーゴールド	ハモグリバエ類						
トマト、ピーマン、かぼちゃ	アブラムシ類、ハダニ類	1,000 倍		収穫前日まで		5 回以内	
なす、すいか						6 回以内	
きゅうり、メロン						ウリハムシ	3 回以内
にがうり	アブラムシ類						
うり類 (漬物用)	アブラムシ類、ハダニ類 ウリハムシ	2,000~ 3,000 倍 1,000 倍					
いちご	アブラムシ類、ハダニ類、 ミカンキイロアザミウマ	2,000 倍				収穫 3 日前まで	6 回以内
レタス	アブラムシ類						
キャベツ、はくさい	アブラムシ類、アザミウマ類	1,000 倍	収穫前日まで	5 回以内			
	アオムシ、カブラハバチ						
カリフラワー、ブロッコリー	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍	収穫 3 日前まで	6 回以内			
	アオムシ	1,000 倍					
だいこん	アブラムシ類	2,000 倍	収穫 14 日前まで		6 回以内		
	アオムシ、ナモグリバエ	1,000 倍					
ねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍	収穫 7 日前まで			6 回以内	
	ネギハモグリバエ	1,000 倍					
たまねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍	収穫 7 日前まで			6 回以内	
	ハモグリバエ類	1,000 倍					
にんじん	アブラムシ類、キアゲハ、ヤサイゾウムシ	2,000 倍	収穫 14 日前まで			4 回以内	