

ほうれんそう	アブラムシ類	2,000 倍	100 ~ 300 mℓ/m <sup>2</sup>	収穫 14 日前まで	4 回以内
かぶ					
豆類(未成熟)	アブラムシ類、ハダニ類 コガネムシ類、アザミウマ類、インゲンテ ントウ	1,000 倍	100 ~ 300 mℓ/m <sup>2</sup>		3 回以内
	ハモグリバエ類、カメムシ類、マメシク イガ				
だいず、あずき、えんどうまめ、 いんげんまめ	アブラムシ類、ハダニ類 コガネムシ類、アザミウマ類	2,000 倍			
	ハモグリバエ、マメシクイガ	1,000 倍			
ぶどう	アブラムシ類、ハダニ類			収穫 7 日前まで	6 回以内
おうとう	アブラムシ類				本剤: 5 回 以内 マラソン: 5 回以内 (休眠期の 50 倍希釈散布 は 1 回以内)
びわ	アブラムシ類				5 回以内
うめ	アブラムシ類、ハマキムシ類 カイガラムシ類				
りんご	アブラムシ類、ハダニ類 リンゴワタムシ	2,000 倍	200 ~ 700 mℓ/m <sup>2</sup>	収穫 14 日前まで	本剤: 5 回以 内 マラソン: 5 回以内 (休眠期から 芽出直後まで は 1 回以 内)
もも	アブラムシ類、ハダニ類カイガラムシ類			収穫 7 日前まで	5 回以内
かんきつ(なつみかんを除く)	アブラムシ類、ハダニ類 ハマキムシ類、カイガラムシ類			収穫 14 日前まで	
かき	ハマキムシ類、カイガラムシ類 イラガ類			収穫 30 日前まで	

- (2009年3月17日付: 注意事項の変更)
- (2011年11月9日付: 作物名の削除、使用液量の追加)
- (2012年11月21日付: 作物名「セルリー」を削除。作物名「かぶ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更。)