

適用病害と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

①散布剤として使用する場合

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量★	使用時期	総使用回数※	使用方法
しょうが	白星病	600 倍	100～300ℓ / 10a	収穫 3 日前まで	本剤:2 回以内、キャプタン:5 回以内 (塊茎粉衣は 1 回以内、灌注は 2 回以内、散布は 2 回以内)	散布
小麦	赤かび病、葉枯症	600～1,000 倍	60～150ℓ / 10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	
	黒変病、黒点病	1,000 倍				
芝	葉腐病(ブラウンパッチ)	300～500 倍	0.5～2ℓ / m ²	発病初期	8 回以内	
		500～800 倍	1～2ℓ / m ²			
	赤焼病	300～800 倍				
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病	300～500 倍	0.5ℓ / m ²			
ばら	黒星病	800 倍	100～300ℓ / 10a	—	8 回以内	
	茎腐病、立枯病、苗立枯病	600 倍				
りんどう	葉枯病、茎腐病、立枯病、苗立枯病					
せんにちこう	斑葉病、茎腐病、立枯病、苗立枯病					
コスモス	そうか病、茎腐病、立枯病、苗立枯病					
ひまわり	べと病、黒斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病					
シネラリア	褐斑病、茎腐病、立枯病、苗立枯病					