

スイトピー	腰折病、茎腐病、立枯病、 苗立枯病							
みやこわすれ アンスリウム	根腐病、茎腐病、立枯病、苗 立枯病							
斑入りアマドコロ	斑点病、茎腐病、立枯病、苗 立枯病							
花き類・観葉植物(ばら、リ んどう、せんいちこう、コス モス、ひまわり、シネナリ ア、スイトピー、みやこわす れ、アンスリウム、斑入り アマドコロを除く)	茎腐病、立枯病、苗立枯病							
ゆきやなぎ	苗立枯病	1,000 倍	200~700ℓ/10a					
せんりょう	炭疽病	600 倍						
トマト	疫病	800~1,200 倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	本剤:5 回以 内、キャプタ ン:5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内)	散布		
	葉かび病、灰色かび病	800 倍						
きゅうり	炭疽病、褐斑病	600~800 倍						
	べと病	600 倍						
しろうり	べと病	600 倍						
かぼちゃ	炭疽病	400~800 倍						
すいか メロン	べと病、つる枯病	600 倍						
	炭疽病	400~800 倍						
ごぼう	黒斑病	800 倍					収穫 14 日前まで	本剤:5 回以 内、キャプタ ン:6 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は 種後は 5 回 以内)
いちご	灰色かび病、炭疽病、芽枯 病	800 倍					収穫 30 日前まで	3 回以内
いんげんまめ	炭疽病	600~1,200 倍	本剤:2 回以 内、キャプタ ン:3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は					