

					種後は2回以内)
たまねぎ				収穫前日まで	本剤:5回以内、キャプタン:6回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
葉たまねぎ	灰色かび病、白色疫病、苗立枯病	600倍			
はくさい	黒斑病、白斑病、苗立枯病	600~1,200倍		収穫7日前まで	本剤:5回以内、キャプタン:6回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
	べと病、炭疽病	600倍			
小粒核果類	黒星病	800~1,000倍	200~700ℓ / 10a	収穫21日前まで	3回以内 本剤:2回以内、キャプタン:5回以内 (生育期は2回以内、収穫終了後~落葉期までは3回以内)
	すす斑病	800倍			
ブルーベリー	斑点病	500~1,000倍			
	すす点病、灰色かび病	500倍			
マルメロ	黒点病	1,000倍		収穫14日前まで	6回以内
パイナップル	根腐萎凋病	500倍	300~400ℓ / 10a	収穫21日前まで	3回以内
パパイヤ	炭疽病	600倍	200~700ℓ / 10a	収穫14日前まで	3回以内
マンゴー				収穫7日前まで	
もも	縮葉病			発芽前	4回以内
かき	落葉病、炭疽病、すす点病	1,000倍			収穫7日前まで
ぶどう	晩腐病、褐斑病、灰色かび病、べと病、枝膨病、黒とう病	800倍		収穫30日前まで	3回以内
おうとう	褐色せん孔病、灰星病、炭疽病			収穫3日前まで	5回以内
りんご	黒星病	600~1,000倍		収穫前日まで	6回以内