

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びエトキサゾールを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量★	使用時期	総使用回数 ※	使用 方法								
かんきつ (みかんを除く)	ミカンハダニ	2,000~3,000 倍	200~700ℓ/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布								
	ミカンサビダニ	2,000 倍												
みかん	ミカンハダニ	2,000~3,000 倍		収穫前日まで										
	ミカンサビダニ	2,000 倍												
りんご	リンゴハダニ	2,000~3,000 倍		収穫 14 日前まで										
	ナミハダニ	2,000 倍												
なし	ハダニ類			収穫 7 日前まで			1 回							
もも	ハダニ類、 モモサビダニ						2 回以内							
すもも、 ネクタリン	ハダニ類						100~350ℓ/10a	収穫前日まで	1 回					
ぶどう														
びわ	ミカンハダニ							2 回以内						
おうとう	ハダニ類							3,000 倍	100~300ℓ/10a	収穫 14 日前まで	1 回			
いちじく			収穫前日まで											
マンゴー					収穫 7 日前まで	2 回以内								
きゅうり			ハダニ類		3,000 倍	100~300ℓ/10a				1 回	2 回以内			
すいか、メロン												収穫前日まで		
なす、いちご										1 回				
とうがん		ハダニ類								3,000 倍		100~300ℓ/10a	収穫前日まで(但し、伏 せ込み栽培は伏せ込み 前まで)	2 回以内
みつば														
しそ				2,000 倍									100~300ℓ/10a	
きく(葉)														
かんしょ							収穫 7 日前まで							
あずき														