

# 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
きく	アブラムシ類	500 倍	100～300ℓ／ 10a (100～300 ml／ m <sup>2</sup> )	発生初期	本剤:5 回以内 アセタミプリド: 5 回以内	散布
ばら、ペチュニア、ゆり					5 回以内	
つつじ類					ツツジゲンバイ	
つばき類	チャドクガ	250 倍	200～700ℓ／ 10a (200～700 ml／ m <sup>2</sup> )	収穫 14 日前まで	3 回以内	
いぬまき	アブラムシ類					
かんきつ						
うめ						
かき	カキノヘタムシガ	500 倍	100～300ℓ／ 10a (100～300 ml／ m <sup>2</sup> )	収穫前日まで	本剤:3 回以内 アセタミプリド: 4 回以内 (粒剤の定植時までの処理は1 回以内、散布、くん煙及び定植 後の株元散布は合計 3 回以 内)	
トマト なす	アブラムシ類				本剤:3 回以内 アセタミプリド: 5 回以内 ( 粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、2 % 粒剤の定植後 の株元散布は1回以内、散布、 くん煙及び 1 % 粒剤の株元 散布は合計 3 回以内 )	
きゅうり						
はくさい	アオムシ	250 倍	100～300ℓ／ 10a (100～300 ml／ m <sup>2</sup> )	収穫 14 日前まで	本剤:3 回以内 アセタミプリド: 4 回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計 3 回以内)	散布
キャベツ				収穫 7 日前まで	本剤:5 回以内 アセタミプリド: 6 回以内 (粒剤の定植時までの処理は	