

					(塗布は3回以内、散布は3回以内)
みかん	そうか病	700~1,000倍		収穫前日まで	本剤:5回以内 チオファネートメチル:8回以内 (塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内)
	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	1,000~2,000倍			
かんきつ (みかんを除く)					
ぶどう	黒とう病	1,000倍		収穫45日前まで	本剤:1回以内 チオファネートメチル:5回以内 (塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内)
キウイフルーツ	果実軟腐病			収穫前日まで	本剤:5回以内 チオファネートメチル:8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内)

★使用液量の単位の読み替え方：「ℓ/10a」＝「mℓ/m²」（例 100～300ℓ/10a＝100～300 mℓ/m²）

- 2007年9月19日付：たまねぎ、なす、かんきつ（みかんを除く）の追加、みかんの変更
- 2008年11月19日付：ぶどうの変更
- 2014年6月25日付：かんきつ（みかんを除く）の変更
- 2020年12月9日付：だいち、キウイフルーツ、りんどうの追加、たまねぎ、みかん、かんきつ（みかんを除く）の変更