

適用害虫と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法
きく	ナミハダニ	1,000 倍	100～300ℓ /10 a (100～300 ml/m ²)	開花前まで	1 回	散布
ばら カーネーション	ハダニ類			発生初期		
げっきつ				開花前まで		
りんどう				収穫前日まで	2 回以内	
いちご				ハダニ類、トマトサビダニ	1 回	
すいか、メロン、きゅうり、 なす、ピーマン	1,500 倍	収穫 3 日前まで				
トマト ミニトマト		収穫 14 日前まで				
かんしょ、さといも、やまの いも		ミカンハダニ、ミカンサビダニ	1,000～ 1,500 倍	収穫 7 日前まで		
しそ科葉菜類(えごま(葉)を 除く)	リンゴハダニ			1,000 倍		
さんしょう(葉)	ハダニ類			1,000～ 1,500 倍	収穫前日まで	
かんきつ		モモサビダニ	1,000 倍			
りんご		ハダニ類	1,000～ 1,500 倍		収穫 3 日前まで	
なし					収穫 7 日前まで	
もも	ハダニ類	1,000 倍	200～700 ℓ/10 a (200～700 ml/m ²)	収穫前日まで	1 回	
小粒核果類、ネクタリン	ハダニ類	1,000～ 1,500 倍	収穫 3 日前まで			
かき			収穫 7 日前まで			
あけび(果実)、マンゴー、ア テモヤ	ハダニ類	1,000 倍	200～700ℓ /10 a (200～700 ml/m ²)	収穫 7 日前まで	1 回	散布
いちじく	ハダニ類	1,000 倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	1 回	
おうとう		1,000～	(200～700 ml / m ²)	収穫 14 日前まで		