

適用害虫と使用方法

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数※	使用方法			
花き類・観葉植物 (ばら、ペゴニア、は ぼたん、ガーベラを 除く)	アブラムシ類	1g/株 (但し、40g/m ² まで)	発生初期	本剤:4回以内 アセフェート:5回以内 クロチアニジン:4回以内	生育期 株元処理			
ばら	アブラムシ類	1g/株 (但し、40g/m ² まで)						
	アザミウマ類、コガネムシ類幼虫、 クロケシツブチョッキリ、チュウレン ジハバチ	2g/株 (但し、40g/m ² まで)						
はぼたん	アブラムシ類、アオムシ	2g/株 (但し、40g/m ² まで)					本剤:4回以内 アセフェート:5回以内 クロチアニジン:6回以内	
ペゴニア	アブラムシ類、コガネムシ類幼虫							
ガーベラ	アブラムシ類、ハモグリバエ類							
クロトン	ミカンコナカイガラムシ							
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	本剤:1回 アセフェート:1回 クロチアニジン:4回以内(育苗期の株元処理 及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散 布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	植穴処理 土壌混和			
なす		2g/株						
きゅうり	コナジラミ類							