

適用害虫と使用方法

※ 印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	2,000 倍	100～300ml/㎡	発生初期 但し、収穫前日まで		散布
野菜類 (はくさいを除く)		1,000～2,000 倍				
	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ	1,000 倍				
うり科野菜類	ウリノメイガ					
パセリ	キアゲハ					
いも類、豆類(種実)	ハスモンヨトウ					
えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう	ウリノメイガ					
ふじまめ	シロイチモジマダラメイガ					
しょくようほおずき	タバコガ					
果樹類	ハマキムシ類					
樹木類	ケムシ類	200～700ml/㎡	発生初期			
とうもろこし	オオタバコガ	1,000～2,000 倍	100～300ml/㎡	発生初期 但し、収穫前日まで		
からしな(種子)	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ					
そば	ハスモンヨトウ					
あわ、ひえ	アワノメイガ					
えごま(種子)	ベニフキノメイガ	1,000 倍	100～300ml/㎡	発生初期 但し、収穫前日まで		
しいたけ	シイタケオオヒロズコガ	200 倍				
		1,000 倍	200～400ml/㎡	発生初期 但し、摘採7日前まで	散布	
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク	1,000 倍	200～400ml/㎡	発生初期 但し、摘採7日前まで		
きく	ハスモンヨトウ		100～300ml/㎡	発生初期		
カーネーション						