

適用害虫と使用方法

※ 印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法
トマト、ミニトマト	アブラムシ類、コナジラミ類	2,000～ 4,000 倍	100～ 300ml/m ²	収穫前日 まで	本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)	散布
	ハモグリバエ類	2,000 倍				
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ、ミナミキイロアザミウマ、ハモグリバエ類、テントウムシダマシ類、カメムシ類	2,000～				
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ、カメムシ類	4,000 倍				
メロン	コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ、ハモグリバエ類、ウリハムシ	4,000 倍				
	アブラムシ類					
ピーマン	アブラムシ類、コナジラミ類	2,000～ 4,000 倍				
	ミナミキイロアザミウマ	2,000 倍				
とうがらし類	アブラムシ類、コナジラミ類	2,000～ 4,000 倍				
	ミナミキイロアザミウマ	2,000 倍				
すいか	アブラムシ類、ウリハムシ	2,000～ 4,000 倍				
	ミナミキイロアザミウマ	2,000 倍				
かぼちゃ	カボチャミバエ	2,000～ 4,000 倍	収穫 3 日前 まで			
	アブラムシ類					
にがうり	ミナミキイロアザミウマ、アブラムシ類	4,000 倍	収穫前日 まで			
食用へちま	アブラムシ類	2,000 倍	収穫 3 日前 まで			
とうがん	ミナミキイロアザミウマ					