

未成熟とうもろこし	アブラムシ類、アカスジカスミカメ	2,000～ 4,000 倍	収穫前日 まで	3 回以内	
オクラ	アブラムシ類				
アスパラガス	アブラムシ類				
	ネギアザミウマ				
	ジュウシホシクピナガハムシ				
	カメムシ類				
ねぎ	ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ	2,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:4 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(定植時までの処理は 1 回以内)	
わけぎ、あさつき				4 回以内	
にら	ネギネクロバネキノコバエ			2,000 倍	3 回以内
	ネギアザミウマ、アブラムシ類			2,000 ～ 4,000 倍	
にら(花茎)				4,000 倍	収穫前日 まで
キャベツ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000～ 4,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:2 回以内、クロチアニジン:3 回 以内(定植時までの処理は 1 回以 内、定植後の散布は 2 回以内)	
	アオムシ、コナガ	2,000 倍		本剤:2 回以内、クロチアニ ジン:5 回以内(定植時ま での処理は 1 回以内、定植 後の散布は 2 回以内、定 植後の株元散布は 2 回以 内)	
はくさい	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍		本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(は種時の土壌混和は 1 回以 内、散布は 3 回以内)	
こまつな、かぶ				本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(は種時及び定植時の土壌混和 は合計 1 回以内、散布は 3 回以内)	
みずな					
チンゲンサイ	ハモグリバエ類	2,000 倍	収穫 7 日前 まで	3 回以内	
非結球あぶらな 科葉菜類(こまつ な、チンゲンサ	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍			