

イ、なばな類*、 みずなを除く)						
ブロッコリー	アオムシ、コナガ	2,000 倍	2,000～ 4,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(定植時までの処理は 1 回以 内、定植後の散布は 3 回以内)	
	はなっこりー	アブラムシ類		2,000 倍	収穫前日 まで	本剤:2 回以内、クロチアニジン:3 回 以内(定植時の土壌混和は 1 回以 内、散布は 2 回以内)
しゅんぎく	アブラムシ類、ハモグリバエ類	2,000～ 4,000 倍	4,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(は種時の土壌混和は 1 回以 内、散布は 3 回以内)	
ほうれんそう				収穫前日 まで		
みつば	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍	4,000 倍	収穫 3 日前 まで	3 回以内	
パセリ		4,000 倍		収穫 14 日前 まで	1 回	
セルリー			2,000～ 4,000 倍	2,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(定植時の土壌混和は 1 回以 内、散布は 3 回以内)
		ハモグリバエ類				
レタス	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍	2,000 倍	収穫前日 まで	本剤:2 回以内、クロチアニジン:5 回 以内(定植時までの処理は 1 回以内、 定植後の散布は 2 回以内、定植後の 株元散布は 2 回以内)	
	アザミウマ類 ナモグリバエ					
非結球レタス	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍	2,000 倍	収穫 7 日前 まで	本剤:2 回以内、クロチアニジン:3 回 以内(は種時の土壌混和は 1 回以 内、は種後は 2 回以内)	
	ナモグリバエ					
だいこん	アブラムシ類	2,000～ 4,000 倍	2,000～ 4,000 倍	収穫 3 日前 まで	本剤:3 回以内、クロチアニジン:4 回 以内(は種時の土壌混和は 1 回以 内、散布は 3 回以内)	
かぶ				収穫 7 日前 まで	本剤:2 回以内、クロチア ニジン:3 回以内(植付前 の処理は 1 回以内、植付 後は 2 回以内)	
かんしょ						