

適用病害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避ため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
トマト	アブラムシ類、葉かび病	原液	収穫前日まで	3回以内	散布
ミニトマト				本剤：1回 フェンプロパトリン:1回 ミクロブタニル:3回以内	
きゅうり	アブラムシ類、うどんこ病			5回以内	
なす	コナジラミ類、うどんこ病			本剤：4回以内 フェンプロパトリン:5回以内 ミクロブタニル:4回以内	
いちご	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病			3回以内	
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、うどんこ病、黒星病		-	本剤：5回以内 フェンプロパトリン：6回以内 ミクロブタニル：5回以内	
きく	アブラムシ類、うどんこ病、白さび病				
はばたん	アブラムシ類、アオムシ、うどんこ病				
マリーゴールド	アブラムシ類、ハスモンヨトウ、うどんこ病				
カーネーション	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、はばたん、マリーゴールド、カーネーションを除く)	アブラムシ類、うどんこ病				
つばき類	チャドクガ、ツノロウムシ				
つつじ類	ツツジグンバイ				
さくら	アメリカシロヒトリ				

- 2010年10月27日付：つばき類他変更。
- 2018年9月12日付：ミニトマトの追加。