

# 適用害虫と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
つばき類	ケムシ類、ツノロウムシ	原液	発生初期	本剤:4回以内 クロチアニジン:6回以内 フェンプロパトリン:6回以内	散布
つつじ類	ケムシ類、ツツジゲンバイ			本剤:4回以内 クロチアニジン:4回以内 フェンプロパトリン:6回以内	
さるすべり	ケムシ類、サルスベリ フクロカイガラムシ			6回以内	
かなめもち	ケムシ類、イラガ類				
樹木類 (つつじ類、つばき類、さるすべり、かなめもちを除く)	ケムシ類				
ガーベラ	アブラムシ類、コナジラミ類				
カトレア	アブラムシ類				
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ				
きく	アブラムシ類、ハモグリバエ類			本剤:4回以内 クロチアニジン:4回以内 フェンプロパトリン:6回以内	
花き類・観葉植物 (ばら、きく、ガーベラ、カトレアを除く)	アブラムシ類				

- 2013年9月11日付：つつじ類、つばき類の追加