

適用病害虫と使用方法

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希 釈 倍数	使 用 時期	使用方法	総使用回数※			
					本剤	クロチア ニジン	フェン プロパ トリン	メパニ ピリム
ばら	アブラムシ類、アザミウマ類、クロケ シツブチョッキリ、コガネムシ類成虫、 コナジラミ類、チュウレンジハバチ、 ハダニ類、ハモグリバエ類、ハスモン ヨトウ、ゴマダラカミキリ成虫	原液	発 生 初期	散布	4 回以内	4 回以内	6 回以内	5 回以内
	うどんこ病、黒星病、灰色かび病		発 病 初期					
花き類・観葉 植物（ばら、 花月を除く）	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジ ラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、 ハスモンヨトウ		発 生 初期					
	うどんこ病、灰色かび病		発 病 初期					
花月	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジ ラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、 ハスモンヨトウ、ミカンコナカイガラ ムシ		発 生 初期					
つつじ類	アブラムシ類、ツツジグンバイ、カイ ガラムシ類、ケムシ類		発 病 初期		5 回以内	6 回以内		
	うどんこ病							
ひいらぎもくせい	アブラムシ類、ヘリグロテントウノミ ハムシ、カイガラムシ類、ケムシ類		発 生 初期					
まさき	アブラムシ類、アオバハゴロモ、カイ ガラムシ類、ケムシ類		発 病					
	うどんこ病							