

適用病害と使用方法

※印は本剤及びその他の有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量★	使用時期	総使用回数※	使用方法	
ばら	うどんこ病、黒星病	1,000 倍	100～300ℓ/10a	-	5 回以内	散布散布	
きく	白さび病	1,000～1,500 倍					
芝	さび病	1,000 倍	1～2ℓ/㎡	発病初期	6 回以内		
芝(日本芝)、 西洋芝(ペントグラス)	フェアリーリング病		10ℓ/㎡				
メロン	うどんこ病	2,000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	5 回以内		
きゅうり、なす		1,000～2,000 倍			3 回以内		
さやえんどう		1,500 倍			5 回以内		
いちご		2,000 倍			2 回以内		
ねぎ	さび病	800～1,000 倍		収穫 3 日前まで	3 回以内		
しそ		1,000 倍			5 回以内		
ピーマン	うどんこ病	1,000 倍		200～700ℓ/10a	収穫 14 日前まで		4 回以内
トマト	葉かび病						
もも	灰星病	800～1,000 倍	100～300ℓ/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内		
食用ぎく	白さび病	1,000 倍	200～700ℓ/10a				
かき	うどんこ病						

★使用液量の単位の読み替え方：「L/10a」＝「ml/㎡」（例 100～300L/10＝100～300ml/㎡）

- ・2011 年 11 月 9 日付：使用制限変更
- ・2018 年 2 月 28 日付：ピーマン、ねぎの変更
- ・2019 年 6 月 27 日付：しその追加