

適用病害と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びベノミルを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数 ※	使用方法	ベノミルを含む農薬の 総使用回数※			
樹木類	ごま色斑点病、炭疽病、輪紋葉枯病	2000 倍	200～700ml/m ²	発病初期	—	散布	—			
いぬつげ	枝枯病									
ばら	うどんこ病	2000～3000 倍	100～300ml/m ²	—	6回以内			6回以内		
	黒星病									
きく	白さび病	1000 倍								
	褐斑病 黒斑病	2000～3000 倍								
りんどう	花腐菌核病	3000 倍								
パンジー	根腐病	2000 倍	セルトレイ (60×30cm)	育苗期	2回以内	灌注	2回以内			
ゼラニウム	黒根病		1 冊当り 500mL							
チューリップ	球根腐敗病	100～500 倍	—	植付前又は貯蔵前		15～30 分間球根浸漬				
		球根重量の 0.1～0.2%				球根粉衣				
		20 倍		植付前	瞬間浸漬					
シクラメン	萎凋病	500～1000 倍	50～100mL/鉢	—	3回以内		3回以内			
トルコギキョウ	立枯病(フザリウム菌)	1000 倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約4～5L)当り500ml	定植前日	1回	灌注	1回			
しゃくやく、ぼたん	根黒斑病	20 倍	—	植付前	2回以内	10 分間苗基部浸漬	2回以内			