

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法			
樹木類	ケムシ類、シャクトリムシ類	400～800 倍	200～700ml/m ²	発生初期	6回以内	散布			
なし	シンクイムシ類	200～300 倍		前日まで	2回以内				
	ハマキムシ類	200 倍							
もも	シンクイムシ類	200～300 倍		7日前まで	6回以内				
	モモハモグリガ	200～400 倍							
	ハマキムシ類	300 倍							
ネクタリン	シンクイムシ類	200～300 倍		7日前まで	3回以内				
	モモハモグリガ	200～400 倍							
かき	カキノヘタムシガ	200～300 倍		200～700ml/m ²	羽化脱出期但し 14 日前まで		5回以内		
キウイフルーツ	キイロマイコガ	100～200 倍							
くり	クリタマバチ								
	クリシギゾウムシ	200 倍							
かんきつ	ミカンハモグリガ	200～400 倍						14 日前まで	6回以内
いちじく	イチジクヒトリモドキ	300 倍						前日まで	2回以内
さるなし	キイロマイコガ	200 倍	7日前まで						
ハスカップ	ハマキムシ類		3日前まで						
ズッキーニ	フキノメイガ	200～300 倍	100～300ml/m ²			7日前まで		本剤:3回以内 ヘル トリン:6 回以内(乳 剤は 3 回以内、粒剤 は 3 回以内)	
だいず	マメシンクイガ	200 倍						前日まで	3 回以内
ピーマン	タバコガ								
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、タマナ ギンウワバ	200 倍		3日前まで	本剤:5回以内 ヘルトリン:5 回 以内(株元灌 注は 2 回以 内)				