

登録番号：第21766号

名称：ラウンドアップマックスロード

適用病害虫の範囲及び使用方法

登録日：2021年12月22日

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつを除く)		一年生雑草		200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		3回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
かんきつ		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200～1000 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	5回以内		5回以内
		多年生雑草		500～1000 ml/10a				
		スギナ		1500～2000 ml/10a				
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
びわ(葉)	-	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草						
		スギナ	収穫7日前まで (雑草生育期)	1500～2000 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				
オリーブ (葉)		一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200～500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 5～50 L/10a	1回		3回以内
		多年生雑草						
		スギナ	収穫21日前まで (雑草生育期)	1500 ml/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		
		マルバツユクサ		500～1500 ml/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	200~1000 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a	3回以内		3回以内
		一年生雑草		200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a			
		多年生雑草		200~1000 mL/10a	少量散布			
		スギナ		1500~2000 mL/10a	25~50 L/10a			
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草		200~500 ml/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回		1回
		多年生雑草		500~1000 ml/10a				
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	200~500 mL/10a	少量散布 5~50 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
		スギナ		1500~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	-	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内		2回以内
		多年生イネ科 雑草		500 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a			
				200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
直播水稻	-	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内
		少量散布 5~50 L/10a						
		多年生イネ科 雑草	500 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a				
		一年生及び 多年生雑草	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a				
		耕起直後~出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)		少量散布 25~50 L/10a				
		一年生雑草		通常散布 50~100 L/10a				
は種 30 日前~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	少量散布 5~50 L/10a							
多年生雑草	少量散布 5~50 L/10a							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数					
				薬量	希釈水量								
麦類	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	少量散布 5~25 L/10a	3 回以内	雑草 茎葉散布	3 回以内					
		一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a								
			耕起前又はは種前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a								
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a								
雑穀類 (そば、とう もろこしを 除く)	-	一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	2 回以内	雑草 茎葉散布	2 回以内					
そば			とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)										
とうもろこし													
豆類 (種実、ただ し、だいず、 あずき、い んげんまめ、 らっかせい を除く)	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)						200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	2 回以内	雑草 茎葉散布	2 回以内
あずき いんげんまめ			収穫 5 日前まで (雑草生育期： 畦間処理)										
だいず	-	一年生雑草	耕起前又はは出芽前まで (雑草生育期)	500mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	1 回	雑草 茎葉散布	4 回以内					
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a								
			落葉終期～ 収穫 14 日前まで (雑草生育期)		50~100 L/10a								

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数						
				薬量	希釈水量									
えだまめ 野菜類 (えだまめ、はくさい、キャベツ、アスパラガス、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、だいこん、トマト、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、なす、びわ(葉)、リーフ(葉)、たらきのき、薬用 にんじん、いも類、豆類(種実)を除く) はくさい キャベツ レタス ねぎ たまねぎ (春播栽培) たまねぎ (秋播栽培)	-	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	3 回以内	雑草茎葉散布	3 回以内						
			収穫前日まで(雑草生育期：畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a				2 回以内					
			耕起前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	1 回								
			耕起前又は定植 5 日前まで(雑草生育期)		200~500 mL/10a				通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	3 回以内	雑草茎葉散布	3 回以内		
			収穫 30 日前まで(雑草生育期：定植後畦間処理)			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a								
			耕起 5 日前まで(雑草生育期)			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a								
			収穫 7 日前まで(雑草生育期：畦間処理)			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a								
			スギナ			1500~2000 mL/10a							少量散布 25~50 L/10a	
			一年生雑草			耕起 5 日前まで(雑草生育期)							200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a
						収穫 7 日前まで(雑草生育期：畦間処理)								通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
にんにく	-	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
ほうれんそう			耕起前又は は種前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	3回以内		3回以内
			にんじん		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内		2回以内
アスパラガス		スギナ	耕起前まで (雑草生育期)	1500~ 2000mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	1回		3回以内
			収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
だいこん		一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内		2回以内
			収穫5日前まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
薬用 にんじん		一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	1回		10回以内 (1年間に 2回以内)
トマト しゃくやく (薬用) たらきのき			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a					
きゅうり なす	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	2回以内	3回以内		
		収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a				
ピーマン とうからし類	一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内	2回以内		
		収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
いも類 (かんしょを除く)	-	一年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	1回
かんしょ			耕起前又は挿苗前まで (雑草生育期)			2回以内		2回以内
		茶	一年生及び多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)				
さとうきび		一年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	2回以内				
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期：畦間処理) (但し、仮茎長1.5m以上)					
		一年生及び多年生雑草	2回以内					
		圃場内の周縁部	一年生雑草	200~500 mL/10a		500~1000 mL/10a		
多年生雑草		500~1000 mL/10a						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
飼料用とうもろこし	-	一年生及び多年生雑草	飼料用とうもろこし出芽前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)		一年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)		通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
きく			雑草生育期 畦間処理					
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	4回以内		4回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~50 L/10a			
		スギナ		1500~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
		マルバツユクサ		500~1500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
樹木等	公園と場運動場等の堤駐道路の鉄道地面	一年生雑草	雑草生育期	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	3回以内	植栽地を木辺等の地に雑草を除去するに木茎葉散布	3回以内
		多年生雑草			通常散布 50~100 L/10a 少量散布 5~25 L/10a			
		一年生及び多年生雑草		500~1000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
		スギナ		1500~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
		スギ、ヒバリソウ、クサ等のつる性多年生雑草、ササ類、雑かん木		1000~2000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			
牧草	牧野、草地(更新・造成)	一年生及び多年生雑草	耕起前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a 少量散布 5~50 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
			耕起整地後～は種当日まで(雑草発生揃期)		少量散布 5~50 L/10a			
		多年生イネ科雑草	最終刈取後：雑草生育期	500~1000 mL/10a	50~100 L/10a			
ソルガム	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
桑	一年生及び多年生雑草	発芽前又は夏切後発芽前(雑草生育期)	少量散布 25~50 L/10a		4回以内			
林木	林地造林地(地ごしらえ)	スギ、ササ類、クサ等の多年生雑草、雑かん木	生育期	1000~2000 mL/10a	30L/10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内
まつ(下刈り)					25L/10a			
飼料用さとうきび	-	一年生雑草	耕起前又は植付前まで(雑草生育期)	200~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a 少量散布 25~50 L/10a			

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数				
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路運 動場宅 地のり 面鉄道 等	クズ	生育期	原液	1~2mL/株	-	株頭注 入処理	-				
		雑かん木	雑かん木 生育期	原液 又は 2倍液	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 地上30cm直径		カ所数		立木注 入処理			
		10cm以下	2~3		10~15cm		4~6		16~20cm	7~9	20cm以上	10以上
林木	林地	クズ・フ ジ等のつ る類	生育期	原液 又は 2倍液	つる径	使用量(mL/株)	つる注 入処理					
		2.0cm以下	0.5		2.1~3.0cm	1.0	3.1~4.0cm	1.5	4.1~5.0cm	2.0	5.1cm以上	3.0以上
		雑かん木、 間伐する すぎ、ひの きの	雑かん 木、間伐 するす ぎ、ひの き 生育期		1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 地上30cm直径	カ所数	立木注 入処理					
畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏~秋 期	原液	5~10mL/本	-	竹釋注 入処理	-				
	畑地	アカギ	アカギ 生育期	1mL/カ所 幹周7~8cm間隔 地上30cm直径	カ所数		立木注 入処理					
					10cm以下	2~3	10~20cm	4~8	20cm以上	10以上		

塗布処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈 倍数	使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の総 使用回数	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路運 動場宅 地のり 面鉄道 等	雑かん木	伐採直後	原液 又は 2 倍液	切り口全体に 十分量を塗布	-	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	-	
樹木類	林地、 畑地			原液	切り口直径	塗布量	4 回以内	切株塗布 処理	4 回以内
牧草	牧野、 草地				5cm以下	2mL			2 回以内
		5~10cm	3~6mL						
		10cm以上	10mL以上						
日本芝 (のしば)	-	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	5~10 倍	3~9L/10a	3 回以内	雑草茎葉 塗布	3 回以内	