

# 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名                 | 適用害虫名   | 希釈倍数     | 使用液量            | 使用時期※  | 総使用回数※                                      | 使用方法 |
|---------------------|---|----------|-----------------|--------|---|------|
| ばら                  | アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、ハスモンヨトウ、クロケシツブチョッキリ、コガネムシ類成虫、ヒラズハナアザミウマ | 100倍     | 100～300ml/<br>㎡ | —      | 6回以内  | 散布   |
| 花き類・観葉植物<br>(ばらを除く) | アブラムシ類、ハダニ類   |          |                 |        |   |      |
| もも                  | アブラムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ  | 100～200倍 | 200～700ml/<br>㎡ | 前日まで   | 本剤：5回以内<br>フェンプロパトリン：10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) |      |
| マンゴー                | チャノキイロアザミウマ   | 100倍     |                 | 14日前まで | 本剤：2回以内<br>フェンプロパトリン：7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内)  |      |
| あずき                 | ハダニ類  |          |                 | 7日前まで  | 3回以内  |      |
| きゅうり                | アブラムシ類、オンシツコナジラミ、ハダニ類   |          |                 | 前日まで   | 5回以内  |      |
| すいか、メロン             | アブラムシ類、ハダニ類   |          |                 |        | 4回以内  |      |
| かぼちゃ                | アブラムシ類  | 100～200倍 |                 | 3日前まで  | 3回以内  |      |
| トマト                 | アブラムシ類、オンシツコナジラミ  |          | 100～300ml/<br>㎡ |        | 5回以内  |      |
| なす                  | アブラムシ類、ハダニ類、オンシツコナジラミ   |          |                 | 前日まで   | 5回以内  |      |
| ピーマン                | アブラムシ類、ハダニ類   | 200倍     |                 |        | 3回以内  |      |
| ししとう                | ハダニ類  |          |                 |        | 3回以内  |      |
| いちご                 | アブラムシ類、ハダニ類   | 100～200倍 |                 |        |   |      |

二石・III 水溶性 火気厳禁 キシレン

・2019年1月30日付：もも、マンゴーの変更