

適用害虫と使用方法

きく ※印は本剤及びその他の成分含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	使用方法		
樹木類	ケムシ類			噴霧液が均一に付着するように30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。		
つつじ類	ツツジグンバイ					
きく	アブラムシ類					
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ					
	ゴマダラカミキリ					
さくら	クビアカツヤカミキリ					
かえで	ゴマダラカミキリ			収穫14日前まで	6回以内	【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。
かんきつ						
いちじく	クワカミキリ			収穫前日まで	2回以内	
びわ、びわ(葉)				収穫7日前まで	3回以内	
りんご	ヒメボクトウ	収穫後から摘果期まで	本剤:2回以内 ペルメトリン:4回以内 (散布は2回以内、噴射は2回以内)			

2018年2月28日付：びわ(葉)、かんきつ、りんご、びわ、いちじく、ばら、かえで、さくらの変更

2017年7月26日付：作物名「ばら」に「ゴマダラカミキリ」、「樹木類」に「ケムシ類」追加

2016年8月3日付：作物名「りんご」の追加

2013年6月26日付：作物名「びわ(葉)」の追加

2013年2月13日付：作物名「びわ」の追加