

# 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	総使用回数※			使用方法
				本剤	クロチアニジン	BT	
トマト、ミニトマト	アブラムシ類	5g/株	定植後 但し、収穫前日まで	3回以内	4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)		株元散布
	コガネムシ類	10g/株	定植時	1回			植穴処理 土壌混和
きゅうり、なす	アブラムシ類	5~10g/株	定植後 但し、収穫前日まで	3回以内			
	うどんこ病	10g/株					
キャベツ	アブラムシ類	5g/株	定植時	1回			
	アオムシ	10g/株					
はくさい	アブラムシ類、ハマダラメカイ	5g/株					
ブロッコリー					4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)		
だいこん	アブラムシ類	15g/m <sup>2</sup>	は種時				播溝処理 土壌混和
ばれいしょ			植付時				4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内)
いちご	アブラムシ類、うどんこ病	5g/株	定植時		1回		植穴処理 土壌混和
ピーマン	アブラムシ類	10g/株	定植後 但し、収穫前日まで	2回以内	3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)		株元散布