

・ラベルをよく読む ・記載以外には使用しない ・小児の手の届く所には置かない

特 長

- ・薄めず、このまま撒くだけの液体シャワータイプ除草剤。
- ・雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
- ・雑草の葉や茎にかけた場合は2～14日ほどで、土にかけた場合は1～2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3～6か月間 雑草の発生を抑えます。(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染みこむように散布してください。)

散布上のポイント

- ・キャップをあけて、薄めず原液のまま、雑草の茎葉全体にしっかりとかかるように散布するか、雑草が生えている地面に散布してください。
- ・散布液が出にくい場合は、ボトル側面を軽く押してください。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布適期は雑草発生前及び雑草生育期(草丈 30cm 以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失ないように散布する。
- 樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれがある場所等では使用しない(薬害)
- 植物の葉面や根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および樹木類等有用植物の付近では使用しない。
- 傾斜地や砂質土壌では使用しない(薬害)
- 本剤を散布した場所やその付近では、有用植物の植付けは行わない(薬害)
-  ● ハウス等の施設周辺では使用しない。
-  ● 本剤の飛散あるいは流出によって、樹木類等の有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布する。
- 水源池、飲料用水、灌漑用井戸、養殖池等に本剤の飛散や流入及び浸透が想定される場所では散布を行わない。
- 本剤が流出するような激しい降雨が予想される場合は散布を行わない。
- 散布器具、容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流れ込まないように十分注意し、環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。

適用雑草と使用方法

※は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数※	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地等	一年生 雑草	雑草発生前	40~80 ml/m ²	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	本剤 及び ブ マ シ ル を 含 む 農 薬	グリホサートを含む農薬
		一年生 及び 多年生 雑草	雑草生育期	20~120 ml/m ²	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布又は 全面土壌散布		
						2回 以内	3回 以内



安全使用上の注意

- 誤飲に注意。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗する(弱い刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 子供の手の届かない場所に保管する。

■ 成 分 グリホサートイソプロピルアミン塩………1.2%
〔イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート〕
ブ
マ
シ
ル………0.45%
〔5-ブ
ロ
モ
-3-セ
コ
ン
ダ
リ
ー
ブ
チ
ル
-6-メ
チ
ル
ウ
ラ
シ
ル〕
水、界面活性剤等………98.35%

■ 性 状 淡黄色～黄色澄明水溶性液体
【魚毒性等】 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(藻類)
【保 管】 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。
横にしないで立てて保管する。

- ★使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。
- ★空容器には他の薬剤を入れない。



BB10H-1

散布上の注意


花壇、芝生、畑、水田(休耕田含む)、樹木などの枯らしたくない植物の周り、傾斜地では絶対に使用しない。

- 枯らしたくない植物が生えている場所には散布せず、**根の先端が張っていると思われる場所から十分離す。**

※ 樹木の場合、横枝が伸びている距離(樹冠下)までは地中で根が

伸びていることが考えられる。**剪定している木の場合**は、樹冠下よりもさらに根が伸びている場合があるので十分注意が必要。

- 散布予定地より低い位置に農耕地や植栽地がある場合、**成分が流出すると薬害を及ぼすおそれがあるので使用しない。**
- 特に**松は除草剤に弱い**ので、松の周辺では使用しない。
- 散布の際は周辺の住民に一声かけるなど配慮する。



こんな雑草に！



ドクダミ



ササ



セイトカアワダチソウ



スギナ

こんな雑草に！



メヒシバ



エノコログサ



ヨモギ



シロツメクサ

キャップの開け方

散布するとき

封印バンドを矢印の方向へ引き、取りはずす。



フタを上方向に押し開ける。容器を傾けるとシャワー状に散布できる。

※薬液が出にくい場合は容器側面を軽く押す。




容器を洗浄するとき

キャップ部全体を持ち、矢印の方向へ回して開ける。



キャップをはずし、洗浄する。

※通気用のパイプが付いているので取扱いに注意する。パイプの先端が図の位置にこないとき、液が出にくい場合がある。



発売元 **レインボー薬品株式会社** 東京都台東区上野1-19-10

お問い合わせ TEL 03(6740)7777 平日9:00~17:00(土・日・祝日は休み)

製造場 小池化学株式会社 赤城工場 群馬県渋川市赤城町長井小川田6-5

トーヤク株式会社 美浦工場 茨城県稲敷郡美浦村木原1876-10

ライオンケミカル株式会社 新堂工場 和歌山県有田市新堂267

最終有効年月(西暦下2けた)・製造番号 底面に記載