

■適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量 (mℓ/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布100 少量散布25	2回以内		3回以内
		多年生雑草		500~1000				
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500	通常散布 50~100 少量散布 25~50.5~15	1回		1回
		多年生雑草		500~1000				
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田					2回以内		3回以内
水田作物 (水稻を除く)	—	一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500	通常散布100 少量散布5~15	1回	雑草茎葉散布	2回以内
移植水稻、直播水稻								
麦類(小麦を除く)		耕起7日前まで(雑草生育期)						3回以内
小麦		多年生イネ科雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期)	250~1000	通常散布 50~100 少量散布 25~50	3回以内		
	一年生雑草	は種後出芽前(雑草生育期)	250~500					
	多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	500~1000	通常散布100 少量散布5~15	1回			
※1 かんぎつ	圃場内の周縁部	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250	通常散布 50~100 少量散布 25~50	3回以内		5回以内
		多年生雑草		250~500				
		一年生雑草		500~1000				
		多年生雑草		250~500				
※2 だいず	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布 25~50.5~15	2回以内		2回以内
			は種後出芽前まで (雑草生育期)					
えだまめ	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50.5~15	1回		3回以内
かんしょ	—	一年生雑草	耕起又は挿苗7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布100、 少量散布5~15	1回		2回以内
※3	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布 25~50.5~15		1回	
だいこん	—	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布100 少量散布5~15	3回以内		2回以内
キャベツ	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布 25~50.5~15		1回	
ねぎ、たまねぎ	—	一年生雑草	定植後時間処理但し、 収穫30日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布 25~50.5~15	3回以内		3回以内
とうがらし類、 にんじん、ピーマン	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布 50~100 少量散布 25~50.5~15	1回		2回以内
アスパラガス、オリーブ(葉)、 きゅうり、たらぎ、トマト、 なす、びわ(葉)、 ほうれんそう、レタス	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250~500	通常散布 50~100 少量散布 25~50.5~15		1回	
しゃくやく(薬用)	—	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布100、 少量散布5~15	1回		10回以内 (1年間に2回以内)
薬用になじん	—	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50.5~15		1回	
はつかだいこん	—	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50.5~15	1回		6回以内
さとうきび(春植え)	—	多年生雑草	耕起10日前まで(雑草生育期)	500~1000	少量散布25~50		2回以内	
茶	—	一年生雑草	摘採7日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50	4回以内		4回以内
樹木類	—	一年生雑草	雑草生育期	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50	2回以内		3回以内
		多年生雑草	更新・造成の10日前まで (雑草生育期)	500~1000	通常散布50 少量散布5~15			
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び多年生雑草	は種10日前~は種当日 (耕起整地後:雑草発生揃期)	250~500	少量散布25~50			
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500	通常散布100 少量散布25.5~15	3回以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000				
スギナ	—	スギナ	生育盛期	2000	少量散布 25~50.5~15			
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、 落葉雑草、かん木	生育盛期以降	1000	少量散布 20~30.5~15		雑草木 茎葉散布	

※1:果樹類(かんぎつ、パイナップルを除く) ※3:野菜類(えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、たらぎ、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用になじん、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、かんしょを除く)
 ※2:豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)